



# INSEKT-OUT

PROGRAM ZWALCZANIA

PLEŚNIAKOWCA LŚNIĄCEGO

# DDD-1

NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA

## SKŁAD:

1RS, 3RS; 1RS, 3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 3-fenoksybenzylu (**permetryna**) 400 g/l;  
(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan  
(RS)-a-cyjano-3fenoksybenzylu (**cypermetryna**) 100g/l;

**STĘŻENIE BÓJCZE: od 0,5%**

**DAWKA BÓJCZA KONCENTRATU NA 1 m<sup>2</sup>: od 0,25 ml**

Preparat **INSEKT-OUT** należy stosować zgodnie z poniższą instrukcją.

**Poniższe dawki oprysku i zamgławiania dotyczą kurnika o powierzchni produkcyjnej 1000 m<sup>2</sup> oraz 3000 m<sup>3</sup> kubatury**

Kurniki o innych powierzchniach i kubaturach należy przeliczyć proporcjonalnie !!!



## I. OPRYSK

Tuż po wywozie kur (przed wywozem obornika) należy stworzyć barierę, która wstępnie, ale skutecznie odetnie drogę uciekającym ku górze chrząszczom.

**Dawka: 200 ml INSEKT-OUT rozpuścić w 20 litrach wody** i takim roztworem opryskać ściany oraz słupy (podpory, filary) w dolnej części do wysokości ok. 1m (rys. OPRYSK I).

**NIE STOSOWAĆ MNIEJ NIŻ: 1L roztworu / 20 m<sup>2</sup>.**

### OPRYSK I:



## II. OPRYSK

Po zakończonych zabiegach mycia i dezynfekcji, na ściany wstępnie osuszone, **nie wapnowane** należy wykonać następny oprysk tak jak za pierwszym razem, tworząc barierę dezynsekcyjną górną i dolną o wysokości ok. 1m, ze szczególnym uwzględnieniem łączenia się ścian z podłogą oraz ścian z sufitem (rys. OPRYSK II).

**Dawka: 500 ml INSEKT-OUT rozpuścić w 50 litrach wody.**

**NIE STOSOWAĆ MNIEJ NIŻ: 1L roztworu / 20 m<sup>2</sup>.**

### OPRYSK II:



## III. ZAMGŁAWIANIE


Po wykonanym zabiegu oprysku należy wykonać zamgławianie termiczne obiektu.

**Dawka: 150 ml INSEKT-OUT na 1,5L wody na 1000 m<sup>3</sup> kubatury.**

Zabieg ten należy wykonać zaraz po oprysku, ponieważ tylko takie postępowanie podniesie skuteczność zwalczania pleśniakowca lśniącego.

**UWAGA: W przypadku pominięcia oprysku należy podwoić dawkę zamgławiania !!!**

### ZAMGŁAWIANIE:



### WAŻNE:

- Przy dużej infestacji można zwiększyć proponowane dawki dwukrotnie oraz dodatkowo preparat połączyć z tzw. "WZMACNIACZEM"
- W przypadku pominięcia zamgławiania podwoić dawkę oprysku.
- W przypadku pominięcia oprysku należy podwoić dawkę przy zamgławianiu.
- **INSEKT-OUT** jest koncentratem przeznaczonym do mieszania z wodą, co oznacza, że w łatwy sposób uzyskamy roztwór dezynsekcyjny do zabiegów zlewania, oprysku lub zamgławiania.
- Do zabiegów zamgławiania zawsze używaj preparatu FLOAT-dodatku poprawiającego skuteczność dezynsekcji.
- Wysoka koncentracja substancji czynnej **INSEKT-OUT** pozwoli uzyskać bardzo dobre wyniki w zwalczaniu pleśniakowca lśniącego.

Pojemność: 100ml, 500ml, 1L, 5L

[www.ZwalczaniePleśniakowca.pl](http://www.ZwalczaniePleśniakowca.pl)